

Patiënt

Adres

INSZ nr. Nr. mutualiteit

Geboortedatum M V

Aanvraagdatum

Staalnamedatum uur door

Uw referentie

Tel. Fax E-mail

Aanvragende arts Handtekening

Duplicaat naar

OPZOEKEN MRSA

Aanvraag MRSA screening
 MRSA kweek uit wonde

Afnamemateriaal MRSA ESwab kit (pooled: 2 roze en 1 witte wisser)
 E-swab (individueel verpakt)
 andere (preciseer aub):

Bemonsteringsplaatsen Pooled sampling (preferentieel voor screeningsonderzoek)
 Neus
 Keel
 Perineum
 Wonde
 Sputum
 Urine
 andere (preciseer aub):

Klinische informatie Screening
 Vroeger reeds positief
 Na decontaminatie
 Infectie (preciseer aub):
 Andere:

Klinische info op rapport? Ja
 Neen

MRSA preventie in woon- en zorgcentra

(een publicatie van de Vlaamse overheid, september 2007)

Hoe de screening uitvoeren?

Een screening voert men uit door een kweek af te nemen van alle lichaamsplaatsen met een hoge kans op MRSA dragerschap. Deze zijn de neus (vooraan in beide topjes van de neus), de keel, perineum alsook alle wonden en stomieën. Bij bewoners met een blaassonde is het nuttig MRSA op te sporen in urine.

Voor een algemene screening mogen de stalen samengevoegd worden in 1 transportmilieu (gepooled) (bv. neus, keel en perineum met de MRSA ESwab kit; twee roze en 1 witte wisser). Wonden worden best individueel bemonsterd.

Systematische screening voor MRSA is niet aangewezen; enkel bij verhoogd risico of wanneer zich een epidemie voordoet zal worden gescreend.

Algoritme voor MRSA-screening in woon-en zorgcentra:

Screening is aangewezen:

- wanneer een bewoner aan het volgende criterium voldoet:
 - *De bewoner onderging een ziekenhuisopname in de 6 maanden voor opname en er is geen transferdocument voorhanden dat getuigt van het niet aanwezig zijn van MRSA.*
- of voldoet aan 3 van volgende 4 criteria:
 1. *De bewoner kreeg een antibioticatherapie (fluorochinolones of cephalosporines) tijdens de voorbije maand.*
 2. *De bewoner heeft een urinesonde of een wonde of een stoma of een katheter.*
 3. *De bewoner heeft een mobiliteitsbeperking (Katz-schaal categorie B of C).*
 4. *De bewoner heeft in het verleden een MRSA-infectie of kolonisatie gehad.*

Wanneer bovenstaand algoritme toepassen?

1. *Bij elke opname in het woon- en zorgcentrum: bij eerste opname en bij heropname na hospitalisatie.*
2. *Bij het verstrengen van het MRSA-preventiebeleid.*

Labo Nuytinck